










	РАЗВОЈНИ ФАЗИ			Причинители на болести и штетници	Препарати	Концен-трација	Раствор по ха	Препа. по ха
	ПО ПОТРЕБА	ТРЕБА	ВАЖНО!!					
I 15-25 Април	ПО ПОТРЕБА Отварање на папките Појава на листови	  	<i>Phomopsis viticola</i> <i>Uncinula necator</i>	FOLPAN 80 WDG MIRAGE 45 EC	0,3 % 0,06 %	300 литри	1 кг 0,2 л	
1. 5-10 Мај	ТРЕБА Интензивен пораст и издолжување на ресите	  	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i>	FOLPAN 80 WDG NIMROD 25 EC	0,2 % 0,04 %	800 литри	1,6 кг 0,32 л	
2. 25-30 Мај	ВАЖНО!! Формирање на цветни папки	  	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Lobesia Botrana</i> (I генерација)	ORIUS 25 EW MAVRIK 24 EW	0,04 % 0,03 %	1000 литри	0,4 л 0,3 л	
3. 10-15 Јуни	ВАЖНО!! Прецветување	  	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Botritis cinerea</i>	SPHINX EXTRA NIMROD 25 EC	0,2 % 0,04 %	1000 литри	2 кг 0,4 л	
4. 25-30 Јуни	ВАЖНО!! Зрна со големина на грашок	  	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Lobesia Botrana</i> (II генерација)	QUALY KESTREL	0,1 % 0,04 %	1000 литри	1 л 0,4 л	
5. 15-20 Јули	ВАЖНО!! Пред затворање на гроздовите	  	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Botritis cinerea</i>	SHAVIT F 72 WDG NIMROD 25 EC	0,2 % 0,03 %	1000 литри	2 кг 0,3 л	
6. 5-10 Август	ТРЕБА Појава на прошарок	  	<i>Botritis cinerea</i> <i>Lobesia Botrana</i> (III генерација)	QUALY MAVRIK 24 EW	0,1 % 0,04 %	1000 литри	11 0,4 л	
			Плевели	GLIPHOGAN EXTRA				2x3л