







РАЗВОЈНИ ФАЗИ

	РАЗВОЈНИ ФАЗИ			Причинители на болести и штетници	Препарати	Концентрација	Раствор по ха	Преп. по ха	
I 15-25 Април	<b>ПО ПОТРЕБА</b> Отварање на папките Појава на листови				<i>Phomopsis viticola</i> <i>Uncinula necator</i>	FOLPAN 80 WDG MIRAGE 45 EC	0,3 % 0,06 %	300 литри	1 кг 0,2 л
1. 5-10 Мај	<b>ТРЕБА</b> Интензивен пораст и издолжување на ресите				<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i>	FOLPAN 80 WDG NIMROD 25 EC	0,2 % 0,04 %	800 литри	1,6 кг 0,32 л
2. 25-30 Мај	<b>ВАЖНО!!</b> Формирање на цветни папки				<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Lobesia Botrana</i> ( I генерација )	ORIOUS 25 EW MAVRIK 24 EW	0,04 % 0,03 %	1000 литри	0,4 л 0,3 л
3. 10-15 Јуни	<b>ВАЖНО!!</b> Прецветување				<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Botritis cinerea</i>	SPHINX EXTRA NIMROD 25 EC	0,2 % 0,04 %	1000 литри	2 кг 0,4 л
4. 25-30 Јуни	<b>ВАЖНО!!</b> Зрна со големина на грашок				<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Lobesia Botrana</i> ( II генерација )	QUALY KESTREL	0,1 % 0,04 %	1000 литри	1 л 0,4 л
5. 15-20 Јули	<b>ВАЖНО!!</b> Пред затворање на гроздовите				<i>Plasmopara viticola</i> <i>Uncinula necator</i> <i>Botritis cinerea</i>	SHAVIT F 72 WDG NIMROD 25 EC	0,2 % 0,03 %	1000 литри	2 кг 0,3 л
6. 5-10 Август	<b>ТРЕБА</b> Појава на прошарок				<i>Botritis cinerea</i> <i>Lobesia Botrana</i> ( III генерација )	QUALY MAVRIK 24 EW	0,1 % 0,04 %	1000 литри	11 0,4 л
					<b>Плевели</b>	GLIPHOGAN EXTRA			2x3л